



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

Главам муниципальных образований
(по списку)

**УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И
ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Мелькомбинатовский пр-д, 8, г. Киров, 610035
Тел./факс (8332) 54-14-27
E-mail: info@rshn43.ru
[hppt://www.rshn43.ru](http://www.rshn43.ru)

30.01.2023 № 01-78-49

на № _____

О направлении информации

Уважаемые главы!

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю (далее – Управление) информирует, что 26.01.2023 в личном подсобном хозяйстве Кочерги Александра Владимировича по адресу: Кишерстского муниципального округа, д. Мазуевка, д 129А, зарегистрирована эпизоотическая вспышка бешенства.

На основании части 1 статьи 3.1, статьи 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 №705 (далее – Приказ № 705) в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27.01.2023 № 5 от «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) бешенству животных на отдельной территории Кишерстского городского округа Пермского края.

Бешенство - острая инфекционная болезнь млекопитающих животных (далее - восприимчивые животные), характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.

В развитии болезни различаются продромальная стадия, стадия возбуждения и стадия параличей.

Продромальная стадия характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и

снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Восприимчивые животные перестают пить, прячутся. Продромальная стадия длится от 12 часов до 3 суток.

Стадия возбуждения характеризуется приступами агрессии, расстройствами чувствительности, оглумоподобным состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.

Стадия параличей характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до 4 суток. Исход болезни летальный.

Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих.

Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

Для профилактики бешенства специалистами в области ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных семейств псовых и кошачьих, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы, вакцинами против бешенства согласно инструкциям по их применению.

В связи с вышеизложенным, Управление просит довести данную информацию до владельцев восприимчивых животных.

Заместитель руководителя



А.А. Попова